

ワクチン	対象疾病	受ける回数	接種対象時期
ロタウイルス	ロタウイルス感染症	ロタリックス2回	生後6～24週未満
		ロタテック3回	生後6～32週未満
四種混合 (DPT-IPV)	ジフテリア・百日せき・破傷風 急性灰白髄炎 (ポリオ)	1期初回 3回	生後2～90か月未満
		1期追加 1回	生後2～90か月未満
ヒブ	Hib感染症	初回 3回	生後2～60か月未満
		追加 1回	生後2～60か月未満
五種混合 (DPT-IPV - Hib)	ジフテリア・百日せき・破傷風 急性灰白髄炎 (ポリオ)・Hib感染症	1期初回 3回	生後2～90か月未満
		1期追加 1回	生後2～90か月未満
小児用肺炎球菌	小児の肺炎球菌感染症	初回 3回	生後2～60か月未満
		追加 1回	生後2～60か月未満
B型肝炎	B型肝炎	3回	生後1歳未満
BCG	結核	1回	生後1歳未満
MR (麻しん、風しん混合)	麻しん 風しん	1期 1回	生後12か月～24か月未満
		2期 1回	小学校入学の前年度
水痘(水ぼうそう)	水痘(水ぼうそう)	2回	生後12～36か月未満
日本脳炎	日本脳炎	1期初回 2回	生後6～90か月未満
		1期追加 1回	生後6～90か月未満
		2期 1回	9～13歳未満
二種混合 (DT)	ジフテリア・百日せき・破傷風 急性灰白髄炎 (ポリオ)	1回	11, 12歳
子宮頸がん予防ワクチン	ヒトパピローマウイルス感染症	6ヶ月の間に2回又は3回	小学校6年生～高校1年生に相当する年齢の女子

個別接種（県内の実施医療機関で受けられます）

※四種混合とヒブを合わせた五種混合ワクチンが令和6年4月1日より開始されます。
すでに四種混合とヒブを接種している場合は、原則として同じワクチンを接種します。